

A red ribbon symbol is centered on a blue background. The ribbon has a gradient from dark red at the top to bright red at the bottom. The Georgian word 'უიღსი' (Uighsi) is written in white, bold, serif font across the center of the ribbon.

უიღსი

აღზათ იქი, რომ შიფსის ჰროზლემა დღესდღეობით კარბრიონსათვის გადაუჭრელი ჰროზლემაა. სნორედ ამიჭომ შეიქმნა ეს საინფორმაციო მასალა, რათა პასუხი გაეყეს იმ კითხვებს, რომლებიც, ვფიქრობთ, შენ უკვე დიდი ხანია გაინტერესებს და რომელიც დაგეხმარება თავად განსაზღვრო შენი მომავალი. ეს ზროშურა საშუალებას მოგყემს, თავიდან აიცილო: სარისკო ქრევა, საფრთხე და არყოფნით გამონკეული შიში.

რა თქმა უნდა, ეს ზროშურა ამომნურავ ინფორმაციას ვერ მოგანვდის და შესაძლებელია დამატებითი კითხვების დაკმაყოფილების სურვილიც გაგიჩნდეს.

ამისათვის აკრიფე ტელეფონის ნომერი:
თბილისი - 25 18 19
ზათუმი - 7 42 13

ყენჭრის "თანადგომა" კონსულტანტები უპასუხობდ არ დატოვებენ შენს შეკითხვებს.

გახსოვდეს: ყოველი ზარი ანონიშური და უფასოა.



შიქსი - შექნილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი - მომაკვდინებელი ინფექციური დაავადებაა. მას იწვევს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი (აივ). ვირუსი ადამიანის ორგანიზმში შეჭრის შემდეგ აზიანებს ორგანიზმის დამცავ ანუ იმუნურ სისტემას და თანდათანობით მწყობრიდან გამოჰყავს იგი.

აივ ინფექცია ეწოდება აივ-ით გამოწვეულ დაავადებას ვირუსის შეჭრის მომენტიდან სიცოცხლის ბოლომდე. ხოლო ტერმინით **შიქსი** აღინიშნება აივ ინფექციის ბოლო სტადია, როდესაც ავადმყოფს უვითარდება გარკვეული დაავადებები და/ან იმუნური სისტემის მძიმე დაზიანება.

შიდსის ვირუსი გადაეცემა ერთი ადამიანიდან მეორეს შემდეგი გზებით:

- სქესობრივი კონტაქტით (ვაგინალური, ორალური, ანალური);



- სისხლით: ინფიცირებული სისხლის გადასხმისას, აივ ინფიცირებული სისხლით დაბინძურებული შპრიცის, ნემსის (საინექციო ნარკოტიკების მოხმარების დროს) გამოყენებისას, არასტერილური სამედიცინო და საპარემოხერო ინსტრუმენტების გამოყენების დროს (სამართებელი, მკრატელი), ტატუირებისას, ინდივიდუალური მოხმარების საგნების გაზიარებით (კბილის ჯაგრისი, საპარსი);




- ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან ახალშობილზე მუცლად ყოფნის (ფუნქციონირების), მშობიარობის ან ძუძუთი კვების დროს.



შიდსის ვირუსი არ გადადის:

- საერთო მოხმარების საგნებით (ჭურჭელი, აბაზანა);



- ხელის ჩამორთმევით;



- საუბრისას, დახველებით და დაცემინებით;



- კოცნით, მოფერებით;



- მწერებისა და ცხოველების ნაკბნით.



აივ ინფექციის მიმდინარეობა და ნიშნები:

აივ ინფექციის მიმდინარეობაში შესაძლებელია ოთხი ფაზის გამოყოფა:

ფანჯრის პერიოდი:

ეს არის პერიოდი ინფიცირების მომენტიდან 8-10 კვირის (2-3 თვის) განმავლობაში, როდესაც სისხლის ანალიზი ვერ გამოავლენს, არის თუ არა ადამიანი აივ-ით ინფიცირებული.

ამ პერიოდში ხანდახან შეიძლება თავი იჩინოს ისეთმა პრობლემებმა, როგორცაა ფაღარათი, ტემპერატურის მომატება, „გრიპოზული“ მდგომარეობა, ლიმფური კვანძების გადიდება. ეს ნიშნები დამახასიათებელია სხვა დაავადებებისთვისაც, ამიტომ ადამიანმა შეიძლება ეჭვიც არ მიიტანოს აივ ინფექციაზე.

მხირა სიმპტომების ფაზა:

ეს ფაზა, რომელიც პირობითად არის გამოყოფილი ფანჯრის პერიოდის შემდეგ, შესაძლებელია რამოდენიმე წელი გაგრძელდეს (საშუალოდ 3-5 წელი). ამ პერიოდში ადამიანი ვირუსის მატარებელია, შეუძლია ინფექციის სხვა ადამიანებისათვის გადაცემა, მაგრამ შეიძლება არ ჰქონდეს ჩვილები და დაავადების ნიშნები. ადამიანი გარეგნულად ჯანმრთელად გამოიყურება. იგი ჩვეულ რითმში აგრძელებს ცხოვრებას. შეიძლება ადგილი ჰქონდეს წონაში კლებას,

ზოგად სისუსტეს, ღამის ოფლიანობას, ლიმფური კვანძების გადიდებას ორ ან მეტ ადგილზე (საზარდული, იღლია) ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

გამონატული სიმპტომების ფაზა:

გამონატული სიმპტომების ფაზის ხანგრძლივობა საშუალოდ 4-5 წელია. ამ ფაზაში ადამიანის იმუნური სისტემის (ორგანიზმის დამცავი სისტემის) მნიშვნელოვანი დაზიანების შედეგად თავს იჩენს ისეთი ინფექციები და სიმსივნეები (ე. წ. ოპორტუნისტული დაავადებები), რომელნიც ჯანმრთელი იმუნური სისტემის პირობებში არ ვითარდებიან. ეს დაავადებები ძალიან ძნელად ექვემდებარებიან მკურნალობას და, თავის მხრივ, შეიძლება ადამიანის სიკვდილის მიზეზი გახდნენ.

შიფსი:

ამ ფაზაში იმუნური სისტემა (ორგანიზმის დამცავი სისტემა) უკვე მძიმედაა დაზიანებული. ვითარდება ფილტვების, თავის ტვინის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის და სხვა ორგანოების ინფექციური დაავადებები და სიმსივნეები, რომელნიც აღარ ექვემდებარებიან მკურნალობას. შიდსი არის აივ ინფექციის ტერმინალური (საბოლოო) სტადია, რომელიც სრულდება ლეტალური გამოსავლით (სიკვდილით).

აივ ინფექციასთან დაკავშირებული კონსულტირების შესახებ

აივ ინფექციაზე გამოკვლევა ადამიანის ცხოვრებაში მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენაა და ამიტომ მას ყოველთვის უნდა ახლდეს კონსულტირება, როგორც გამოკვლევაშივე, ასევე გამოკვლევის შემდეგ.

გამოკვლევაშივე კონსულტირების მიზანია, ადამიანს მიეწოდოს ზუსტი (დაწვრილებითი) ინფორმაცია დაავადების, გამოკვლევის მიმდინარეობის, სარისკო ქცევების შესახებ. ეს ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იყოს ადვილად გასაგებ ენაზე. კონსულტირებისას დრო ეთმობა ადამიანის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას და ანალიზისათვის მომზადებას. კონსულტირება დაფუძნებულია კონფიდენციალურობის პრინციპზე, რაც ნიშნავს, რომ კლიენტისაგან მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ მასსა და კონსულტანტს შორის დარჩება.

აივ-ზე გამოკვლევის შემდეგ კონსულტირების მიზანია, ადამიანმა კარვად გაცნობიეროს გამოკვლევის შედეგები. მიუხედავად იმისა, თუ რა იყო ტესტირების შედეგი, აუცილებელია, ადამიანმა გარკვეული დრო დაუთმოს საკუთარი განცდების გაცნობიერებას, დავეკმოს მომავალი ცხოვრება, იფიქროს სარისკო ქცევის შემცირებაზე და ა.შ.

ბავშვირება აივ შიღსზე

იმისათვის, რომ გაიგო, ხარ თუ არა აივ ინფიცირებული, უნდა გაიკეთო სისხლის გამოკვლევა აივ-ზე. ეს გამოკვლევა, როგორც წესი, პასუხს იძლევა ორგანიზმში ვირუსის შეჭრიდან 8-10 კვირის შემდეგ.

არსებობს ანალიზის პასუხის 3 ვარიანტი:



უარყოფითი - კლიენტი არ იყო ინფიცირებული 3 თვის წინ;

დადებითი - კლიენტი აივ ინფიცირებულია და გაეცნობა არსებულ სოციალურ და სამედიცინო სამსახურებს, გარდა ამისა, ის გაიელს ტესტის შემდგომ კონსულტირებას;

გაუზრუნველელი - კლიენტის სისხლის ანალიზი არასაკმარისად მკაფიოა და აუცილებელია განმეორებითი ტესტირება აივ-ზე.

ტესტირება მიმდინარეობს **რამდენიმე** საფეხურად. თუ თითოეულ საფეხურზე მიღებული პასუხი უარყოფითია, შემდეგ საფეხურზე ტესტირება აღარ არის საჭირო. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი არ არის ინფიცირებული. ხოლო თუ პასუხი დადებითია, საჭიროა ტესტირების შემდეგი საფეხურის ჩატარება. მხოლოდ ყველა ეტაპზე მიღებული დადებითი პასუხის შემთხვევაში ვაღვენტ, რომ ადამიანი აივ ინფიცირებულია.

შესაქვავალია თუ არა აივ ინფექციის მკურნალობა?

დღეისათვის აივ ინფექციის სამკურნალოდ არსებობს ანტივირუსული მედიკამენტები. ეს მედიკამენტები ახანგრძლივებენ ადამიანის სიცოცხლეს. თუმცა ისინი სრულიად ვერ თრგუნავენ ვირუსს და მხოლოდ გარკვეული დროით აფერხებენ მის გამრავლებას.

დღიისათვის აივ ინფექცია/შიდსის საკოლორ განკურნება არ ხდება, ამიტომ აუსილავალია ვირუსოტო მიხი თავიდან ასილავისათვის.

როგორ დავიხვავთ თავი აივ ინფექციისაგან:

- ერთგული და ჯანმრთელი პარტნიორის ყოლით;
- თუ შენი პარტნიორი არ არის შენი ერთგული ან შენ ერთზე მეტი პარტნიორი გყავს, ყოველი

სქესობრივი კავშირის დროს აუცილებელია კონდომის (პრეზერვატივის) გამოყენება;


- მოითხოვე სტერილური სამედიცინო და საპარიკმახერო ინსტრუმენტები, ასევე ყოველთვის გამოიყენე ერთჯერადი ნემსები და შპრიცები;
- ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებისაგან თავის შეკავებით;
- სქესობრივი ურთიერთობებისგან თავის შეკავებით.

ეს გნიუხნალოვანია!

თუ ჩატარებული ანალიზის პასუხი დადებითია, თქვენ ხართ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებული, ამ ვირუსის მატარებელი, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ შიდად დაავადებული. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ ამ დროს შეგიძლიათ ეს ინფექცია სხვას გადასდოთ. აივ ინფიცირებულობის შემთხვევაში ინფექციასთან ბრძოლის ერთადერთ საშუალებას ექიმის რჩევების შესრულება წარმოადგენს. გარდა ამისა, არსებობს გარკვეული წესები, რომელთა დაცვაც ხელს უწყობს იმუნური სისტემის გაძლიერებას და ჯანმრთელობის შენარჩუნებას:

- ჯანსაღი კვება სხეულის წონის შესანარჩუნებლად;
- ალკოჰოლისა და ნარკოტიკებისგან თავის შეკავება;
- ცხოვრების ჯანსაღი წესის შემოღება - ძილის რეჟიმის დაცვა, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვები.

ყურადღება! აივ ინფექციასა და სქესობრივი გზით გადადებ ინფექციებს შორის მჭიდრო კავშირი არსებობს, რადგან ერთის არსებობა ზრდის მეორის გადადების რისკს.



რაკი ამ გვერდამდე მოხვედი, იმედია ზოლომდე
გაურანი ჩვენს მიერ მონოღებულ ინფორმაციას.
გავიჩნდა რაიმე ღამატეზითი შეკითხვები?
არ მოგერიდოს, აურიფე ტელეფონის ნომერი
თბილისი - 25 18 19

ზათუმი - 7 42 13

და გიპასუხებენ: **"თანადგომა ვისმენტ"**

საუკეთესო სურვილებით
რენტრი "თანადგომა"

კონსულტაციებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ:

საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური
ცენტრი "თანადგომა"

თბილისი
ტელ.: 25 18 19

ბათუმი
ტელ.: 7 42 13

ვებ-გვერდი: www.tanadgoma.ge

კონსულტაციები უფასო და ანონიმური

