

Примечания

Что произойдет, если я забуду вовремя принять лекарство?

- Если это случится более одного раза в месяц, ваше лечение может стать неэффективным.
- ВИЧ распространится в вашем организме и ослабит иммунную систему.
- Новые штаммы вируса приобретут устойчивость к противовирусным препаратам, то есть лекарства перестанут быть для вас эффективными.
- Вам назначат другую, более сложную схему лечения, и другие препараты могут вызвать новые побочные эффекты.

Хотите узнать больше?

NAM – общественная организация, работающая в Великобритании в области ВИЧ-инфекции. Мы осуществляем свою деятельность в тесном сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения, исследователями и сотрудниками социальных служб, а также с людьми, непосредственно затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции. Мы выпускаем печатные и онлайн-материалы по ВИЧ-инфекции (на английском языке), распространяя информационные ресурсы для людей, живущих с ВИЧ, и специалистов, работающих в области ВИЧ/СПИДа.

Данный материал подготовлен на основе оригинальной публикации NAM, защищенной авторским правом. NAM не несет ответственности за достоверность перевода и его актуальность в местных условиях.

Мы сожалеем, что, будучи англоязычной организацией, не можем общаться с читателями на русском языке, однако на нашем сайте aidsmap.com вы можете найти базу данных с возможностью поиска организаций в самых разных уголках мира. Воспользуйтесь ею, чтобы найти нужную организацию или службу в вашем регионе.

На сайте aidsmap.com вы можете читать и загружать переведенные материалы.

Базовая информация: прием препаратов по схеме



NAM

Адрес: Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE
United Kingdom

Тел.: +44 (0) 20 7840 0050

Факс: +44 (0) 20 7735 5351

Веб-сайт: www.aidsmap.com

Эл. почта: info@nam.org.uk

Информация в данном информационном листке соответствует рекомендациям по лечению и уходу при ВИЧ-инфекции в Европе.

Материал (информация и дизайн) подготовлен при финансовой поддержке профилактической программы 'UK's NHS Pan-London HIV Prevention Programme' и Департамента здравоохранения 'NHS South West Essex'.

Перевод сделан при финансовой поддержке компании «Мерк, Шарп энд Доум» (Merck, Sharp and Dohme).

Copyright ©NAM 2010.

Для перевода, адаптации или воспроизведения данного информационного листка необходимо обратиться в нашу организацию.

Общественная организация NAM зарегистрирована в Великобритании (регистрационный номер – 1011220).


NAM предоставляет бесплатные информационные ресурсы тысячам людей по всему миру. Если вы хотите сделать пожертвование, посетите нашу страницу: www.aidsmap.com/donate.

Благодарим «СПИД Фонд Восток-Запад» (*AIDS Foundation East-West, AFEW*) за перевод этого материала.


Чтобы лечение ВИЧ-инфекции было эффективным, вы должны принимать препараты в указанное время, не пропуская ни одной таблетки.




1 Важно принимать все назначенные препараты в определенное время и в указанной дозе. Например, если вам назначено принимать лекарство два раза в день, это означает, что одна таблетка будет иметь силу около 12 часов.




2 Следующую таблетку нужно принять до того, как предыдущая перестанет оказывать воздействие.



3 Если вы задержитесь с приемом таблетки, ваш организм на какое-то время окажется лишенным защиты и ВИЧ инфицирует новые клетки.



4 Если вы примете препарат вовремя, лекарство будет равномерно распределяться в вашем организме, и он сможет сохранить контроль над вирусом.



Важные моменты

- Обязательно принимайте все предписанные препараты вовремя и в указанной дозе.
- Регулярное поступление противовирусных препаратов обеспечит постоянную защиту организма, и он сможет успешно бороться с вирусом.
- Нарушение режима лечения может привести к тому, что терапия быстро станет менее эффективной.